

PREPARO PARA MANOMETRIA ANORRETAL

- Não precisa estar em jejum.
- Não há necessidade de suspender medicamentos em uso.
- **Phosfo enema** (encontrado em drogarias): 1 frasco, aplicar via retal de 2 a 4 horas antes do exame: o (a) paciente deve tentar segurar o conteúdo aplicado por 2 minutos e evacuar em seguida;
- No caso de pacientes do sexo feminino, **deve realizar o exame fora do período menstrual.**
- Caso tenha os seguintes exames anteriores: **Colonoscopia, Enema Opaco, Ultrassonografia Endoanal, Defecografia, Ressonância Nuclear do Assoalho Pélvico ou Manometria Anorretal.** Deverá trazer no dia do exame.
- Este exame **não deve ser realizado** no mesmo dia que a **Colonoscopia** pois os sedativos e o preparo deste exame interferem no resultado.
- Este exame **pode ser** realizado no mesmo dia que a **Anuscopia**, desde que seja realizado primeiro, pois a Anuscopia interfere no resultado.
- Caso o paciente tenha realizado exame **radiológico com contraste**, deverá aguardar **no mínimo dois dias** para realizar a **Manometria Anorretal.**
- Esse exame é contra - indicado no 1º trimestre de gestação.
- Trazer pedido médico, carteirinha do convênio e documento com foto.